newfoundland

Selbsttests

3 Darmgesundheit

4 Drogen und Alkohol

5 Eisenmangel

6 Eisprung

7 Harnwegsinfektion (in Kürze verfügbar)

8 HIV 1/2

9 Influenza 1/2

10 Magengeschwür

11 Menopause

12 Männliche Fruchtbarkeit

13 Nierengesundheit

14 Prostata-Gesundheit (in Kürze verfügbar)

15 Schilddrüsenfunktion

16 Schwangerschaft

17 Vitamin D

Darmgesundheit

Selbsttest zum Nachweis von okkultem Blut im Stuhl zur Unterstützung von Darmkrebs-Früherkennung

Viele Krankheiten können verstecktes Blut im Stuhl verursachen. Dies wird auch als fäkales okkultes Blut (FOB) bezeichnet. Im Frühstadium zeigen Magen-Darm-Erkrankungen wie Dickdarmkrebs, Geschwüre, Polypen, Kolitis, Divertikulitis und Fissuren möglicherweise keine sichtbaren Symptome, sondern nur okkultes Blut.

Insgesamt liegt das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, bei etwa 1 zu 23 für Männer und 1 zu 26 für Frauen. Darmkrebs ist die dritthäufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle bei Männern und Frauen und die zweithäufigste Ursache für Todesfälle, wenn man die Zahlen für Männer und Frauen zusammenfasst.

Der Newfoundland Darmgesundheitstest ist ein fäkaler immunchemischer Schnelltest (FIT) zum qualitativen Nachweis geringer Mengen von okkultem Blut im Stuhl. Der Test verwendet einen doppelten Antikörper-Assay, um fäkales okkultes Blut selektiv nachzuweisen. Darüber hinaus wird die Genauigkeit des Tests im Gegensatz zu Guajak-Tests nicht durch die Ernährung der Patienten beeinflusst.

Leistung

- Nachweisgrenze für FOB – 50 ng/mL
- Genauigkeit 99 %
- Ergebnis in nur 5 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Stuhl

Format
Dipstick

CE 0123

PZN: 18757287

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
1	140x55x20	32	400	58,5x30,5x42,5	14,3

newfoundland

Drogen und Alkohol

Schnelltest für Drogen, Drogenmetaboliten und Alkohol im Speichel

Der Newfoundland Drogen- und Alkoholtest ist ein chromatographischer Lateral-Flow-Test für den professionellen Nachweis mehrerer Drogen und Drogenmetaboliten im Speichel.

Leistung

- Der Test weist Substanzen bei den folgenden Grenzkonzentrationen nach

Substanz	Grenzkonzentration
Amphetamin	50 ng/mL
Kokain	20 ng/mL
Opiate	25 ng/mL
Marihuana	12 ng/mL
Benzodiazepine	10 ng/mL
Ketamin	50 ng/mL
Alkohol	0.02 % (0.2 per mille)

- Ergebnis in nur 3 Minuten
- Der Test dient ausschließlich der Diagnose, eines nicht medizinischen Zustands und unterliegt daher nicht der IVD-Regulierung. Es wird keine benannte Stelle (NB) benötigt.

Verwendung
Laienanwendung

Proben
Speichel

Format
Becher

CE

PZN: 18757318

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
1	121x81x65	94	120	51x41,5x43	12,5

newfoundland

Eisenmangel

Selbsttest zum Nachweis von Ferritin im Vollblut, um die Diagnose einer Eisenmangelanämie zu unterstützen

Anämie aufgrund von Eisenmangel ist bei Kindern und Erwachsenen aller Altersgruppen häufig, insbesondere bei Frauen während der Menstruation (mindestens 20 % leiden an Eisenmangel). Die Hauptsymptome sind extreme Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen, blasse Haut, Muskel- und Gelenkschmerzen, Gewichtszunahme, Herzklopfen, manchmal verbunden mit Schlafstörungen, Schwäche, Brustschmerzen, schnellem Herzschlag oder Kurzatmigkeit.

Eine leichte Eisenmangelanämie verursacht normalerweise keine Komplikationen. Bleibt diese jedoch unbehandelt, kann sie schwerwiegend werden und zu gesundheitlichen Problemen wie Herzversagen, Komplikationen während der Schwangerschaft sowie zu Wachstums- und Entwicklungsverzögerungen bei Kindern führen.

Der Newfoundland Eisenmangeltest ist ein qualitativer Lateral-Flow-Test zum Nachweis von menschlichem Ferritin im Vollblut.

Leistung

- Ferritin-Nachweisgrenze – 30 ng/mL
- Genauigkeit 95 %, Sensitivität 91 %, Spezifität 96 %
- Ergebnis in nur 5 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Blut

Format
Kassette

CE 0123

PZN: 18757382

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
1	130x70x20	40	360	50,5x38x41,5	15,8

newfoundland

Eisprung

Selbsttest zum Nachweis von luteinisierendem Hormon (LH) im Urin als Indikator für das Einsetzen der Ovulation (Eisprung)

Der Eisprung ist die Freisetzung einer Eizelle aus dem Eierstock. Die Eizelle gelangt dann in den Eileiter, wo sie befruchtet werden kann. Damit es zu einer Schwangerschaft kommt, muss die Eizelle innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Freisetzung von Spermien befruchtet werden. Unmittelbar vor dem Eisprung produziert der Körper eine große Menge an luteinisierendem Hormon (LH), welches die Freisetzung einer reifen Eizelle aus dem Eierstock auslöst. Dieser LH-Anstieg findet normalerweise in der Mitte des Menstruationszyklus statt.

Der Newfoundland Ovulationstest ist ein Lateral-Flow-Test für zu Hause, mit dem der Spitzenwert des luteinisierenden Hormons (LH) im Urin bestimmt werden kann, um den Zeitpunkt des Eisprungs und der maximalen Fruchtbarkeit vorherzusagen. Während dieser fruchtbaren Zeit ist die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft am größten.

Leistung

- Nachweis von LH im Urin – 30 mIU/mL
- Genauigkeit >99,9 %, Sensitivität >99,9 %, Spezifität >99,9 %
- Ergebnis in nur 3 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Urin

Format
Midstream

CE 0123

PZN: 18757442

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
5	190x60x45	99	840	55x46x39,5	18,5

newfoundland

Harnwegsinfektion (in Kürze verfügbar)

Selbsttest zum Nachweis von Leukozyten und Nitriten im Urin, um die Diagnose zu unterstützen

Unter einer Harnwegsinfektion (HWI) versteht man eine Infektion in einem beliebigen Abschnitt des Harnsystems, einschließlich der Harnleiter, der Blase, der Harnröhre und der Nieren. In der Regel betrifft die Infektion die unteren Harnwege, d.h. die Blase und die Harnröhre. Frauen haben ein höheres Risiko an Harnwegsinfektionen zu erkranken als Männer. Infektionen, die sich auf die Blase beschränken, können Beschwerden und Reizungen verursachen. Wenn sich eine Harnwegsinfektion jedoch auf die Nieren ausbreitet, kann sie zu schweren gesundheitlichen Problemen führen.

Der Newfoundland HWI-Test ist ein Lateral-Flow-Test für zu Hause zum Nachweis von Leukozyten und Nitriten im Urin, um den Auftritt einer Harnwegsinfektion festzustellen.

Leistung

- Nachweisgrenze im Urin für Leukozyten 9 Zellen/µL, für Nitrite 0,05 mg/dL
- Genauigkeit 94 % für Leukozyten und 98 % für Nitrite

Verwendung
Selbsttest

Proben
Urin

Format
Strip

CE 0123

PZN: 18757399

Verpackungs-Optionen

Kit

Tests	Größe, mm	Gewicht, g
3	132x82x30	28

newfoundland

HIV-1/2

Ein schneller Selbsttest zum Nachweis von Antikörpern auf HIV Typ 1 und Typ 2 durch kapillare Blutentnahme

Das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) ist ein Virus, welches das menschliche Immunsystem infiziert und das erworbene Immundefizienz-Syndrom (AIDS), eine lebensbedrohliche Krankheit, verursachen kann.

Es gibt zwei Arten von Viren: HIV-1 und HIV-2. Es ist wichtig, auf beide Typen zu testen, da für die Diagnose unterschiedliche Tests erforderlich sind und Menschen, die mit HIV-2 infiziert sind, bei einigen HIV-1-Tests negativ reagieren können. HIV-1 ist leichter zu übertragen und schreitet schneller voran. Menschen mit HIV-2 können viele Jahre lang asymptomatisch bleiben, bevor sie Symptome entwickeln.

In Europa wurde bei mehr als 560 000 Menschen HIV diagnostiziert, und jedes Jahr erhalten 18 000 weitere Personen eine positive HIV-Diagnose. HIV hat unverhältnismäßig starke Auswirkungen auf bestimmte Gruppen, insbesondere auf homosexuelle und bisexuelle.

Der Newfoundland HIV-Test ist ein immun chromatographischer In-vitro-Schnelltest zum Nachweis von Antikörpern auf HIV-1 und HIV-2 im Vollblut. Die sterile Lanzette und die Blutentnahmeeinheit sind in einer einzigen Kassette integriert, was die Fehleranfälligkeit des Tests verringert.

Leistung

- Genauigkeit 99,6 %, Sensitivität 99,6 %, Spezifität 99,6 %
- Kleine Blutentnahme von 10 µL
- Ergebnis in nur 15 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Blut

Format
Kassette

CE 0123

PZN: 18757376

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
1	176x73x30	84	120	54,5x35,5x32	10,9

newfoundland

Influenza A/B

Ein schneller Selbsttest zum Nachweis von Influenzavirus Typ-A- und Typ B (Grippe)-Antigenen unter Verwendung einer Nasenabstrichprobe

Verwendung
Selbsttest

Proben
Nasenabstrich

Format
Kassette

CE 0123

PZN: 18744304 (1/T) 18744072 (3/T) 18744089 (5/T)

Die Influenza ist eine akute Atemwegserkrankung, die durch Influenzaviren verursacht wird, die hochinfektiös sind und nur eine kurze Zeitspanne überdauern. Influenza-Patienten haben in der Regel Symptome wie hohes Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Müdigkeit, begleitet von Atemwegssymptomen wie Halsschmerzen, Husten und Auswurf. In der Regel führt ein gutes menschliches Immunsystem zu einem milden Verlauf der Krankheit. Jedoch kann es bei Säuglingen, älteren Menschen und Patienten mit kardiopulmonalen Grunderkrankungen kann es zu schweren Komplikationen wie Lungenentzündung kommen, die entsprechend auch zum Tod führen können.

Der Newfoundland Influenza A/B-Test ist ein chromatographischer Schnelltest für den qualitativen und differenzierten Nachweis von Influenzaviren des Typs A, einschließlich der derzeit bekannten Subtypen und der Antigene des Typs B, direkt aus Nasen-, Oropharyngeal- oder Nasopharyngealabstrichen von Personen, bei denen Symptome wie plötzlich auftretendes Fieber, Husten (in der Regel trocken), Kopfschmerzen, Muskel- und Gelenkschmerzen usw. auftreten.

Leistung

- Influenza A: Genauigkeit 99.4 %, Sensitivität 100 %, Spezifität 99.2 %, Grenzwert 6.88 · 102 TCID50/mL
- Influenza B: Genauigkeit 99.7 %, Sensitivität 100 %, Spezifität 99.6 %, Grenzwert 1.88 · 102 TCID50/mL
- KEINE Kreuzreaktivität mit Coronavirus-Infektionen
- Ergebnis in nur 15 Minuten

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
1	120x80x22	30	240	56,5x36,5x39	8
3	120x80x36	53	432	46,5x36x39	8,5
5	165x80x45	80	600	52x44x39x5	10,7

newfoundland

Magengeschwür

Selbsttest zum Nachweis von Helicobacter-pylori-Antigen im Stuhl zur Unterstützung der Diagnose von Gastritis oder Magengeschwüren

Magengeschwüre sind offene Wunden, die sich an der Innenseite des Magens bilden. Das häufigste Symptom eines Magengeschwürs sind Magenschmerzen. Magengeschwüre werden hauptsächlich durch zwei Faktoren verursacht: Eine bakterielle Infektion mit Helicobacter pylori (H. pylori) und die längere Einnahme von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR).

Schätzungen zufolge erkrankt einer von fünf Menschen einmal im Leben an einem Geschwür. Jedes Jahr erkrankt weltweit 1 von 2000 Menschen an einem Geschwür.

Der Newfoundland Magengeschwür-Test ist ein chromatographischer Schnelltest für den qualitativen Nachweis von H. pylori-Antigenen in menschlichen Stuhlproben. Der Test verwendet für H. pylori-Antigene spezifische Antikörper zum selektiven Nachweis von H. pylori-Antigenen in menschlichen Stuhlproben.

Leistung

- Genauigkeit 98 %, Sensitivität 98 %, Spezifität 98 %
- Ergebnis in nur 10 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Stuhl

Format
Kassette

CE 0123

PZN: 18757471

Verpackungs-Optionen

Kit

Tests	Größe, mm	Gewicht, g
1	130x70x20	38

Karton

Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
360	50,5x38x41,5	15,2

newfoundland

Menopause

Selbsttest zum Nachweis von follikelstimulierendem Hormon (FSH) im Urin als Indikator für den Beginn der Menopause (Wechseljahre)

Die Menopause ist das endgültige Ausbleiben der Menstruation, wird aber in der Regel erst ein Jahr nach dem Ausbleiben der Regelblutung wissenschaftlich diagnostiziert. Der Zeitraum vor der Menopause und die 12 Monate danach werden als Perimenopause bezeichnet. Viele Frauen leiden in dieser Zeit unter Symptomen wie Hitzewallungen, unregelmäßigen Menstruationszyklen, Schlafstörungen, Scheidentrockenheit, Haarausfall, Angstzuständen, Stimmungsschwankungen, Kurzzeitgedächtnisverlust und Müdigkeit. Der Beginn der Perimenopause wird durch Veränderungen des Hormonspiegels im weiblichen Körper verursacht, der den Menstruationszyklus reguliert.

Der Newfoundland Menopausentest verwendet eine Kombination von Antikörpern, einschließlich monoklonaler Anti-FSH-Antikörper, um selektiv erhöhte Spiegel des follikelstimulierenden Hormons (FSH) nachzuweisen. Das Verfahren besteht aus zwei Tests, die im Abstand von einer Woche durchgeführt werden, um die Perimenopause unabhängig vom Zyklus zu bestätigen.

Leistung

- Nachweis von FSH im Urin – 25 mIU/mL
- Ergebnis in nur 3 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Urin

Format
Midstream

CE 0123

PZN: 18757436

Verpackungs-Optionen

Kit

Tests	Größe, mm	Gewicht, g
2	190x60x22	46

Karton

Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
672	55x46x39,5	17,2

newfoundland

Männliche Fruchtbarkeit

Selbsttest zur Bestimmung der Spermienzahl im Samen als Indikator für die männliche Fruchtbarkeit

Die Spermienkonzentration ist einer der wichtigsten Faktoren, die von Ärzten zur Diagnose der männlichen Unfruchtbarkeit herangezogen werden. Es gibt viele Gründe, warum ein Mann unfruchtbar sein kann. Der häufigste Grund ist eine abnorm niedrige Produktion lebensfähiger Samenzellen. Andere Gründe sind eine übermäßige Produktion inaktiver, schwacher oder deformierter Spermien, ein hoher Gehalt an anderen Zellen im Samen, die die Befruchtung behindern, oder andere physiologische Faktoren.

Bis zu 15 % der Paare leiden unter Unfruchtbarkeit, d. h. sie werden nach einem Jahr ungeschütztem, zeitlich gut abgestimmtem Geschlechtsverkehr nicht schwanger. Bei 40 % der Paare, die mit Unfruchtbarkeitsproblemen zu kämpfen haben, ist die männliche Unfruchtbarkeit die Hauptursache.

Der Newfoundland-Test für männliche Fruchtbarkeit ist ein chromatographischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis des akrosomalen Proteins SP-10 in menschlichem Sperma zur Abschätzung der Spermienkonzentration.

Leistung

- Nachweis von Spermien in der Samenflüssigkeit – 15 Millionen/mL
- Ergebnis in nur 5 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Sperma

Format
Kassette

CE 0123

PZN: 18757413

Verpackungs-Optionen

Kit

Tests	Größe, mm	Gewicht, g
1	121x65x81	57

Karton

Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
120	51x41,5x43	7,6

newfoundland

Nierengesundheit

Selbsttest zum Nachweis von Albuminurie im Urin, um die Diagnose einer chronischen Nierenschädigung zu unterstützen

Mikroalbuminurie (MAU) ist ein Begriff, der einen mäßigen Anstieg des Albuminspiegels im Urin beschreibt. Albumin ist ein normales Protein im Blut, aber neu auftretende oder zunehmende Proteinmengen im Urin können ein frühes Anzeichen einer diabetischen Nierenschädigung sein.

Die Häufigkeit der Mikroalbuminurie wurde in der Allgemeinbevölkerung mit 5% angegeben.

Der Newfoundland Nieren-Gesundheitstest validiert über bestimmt Marker das Auftreten von Mau und die entsprechende Immunchromatographie, die auf dem Prinzip der konkurrierenden Bindung basiert, um erhöhte Werte von Albumin im menschlichen Urin nachzuweisen.

Leistung

- Genauigkeit 98 %, Sensitivität 98 %, Spezifität 97 %
- Ergebnis in nur 3 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Urin

Format
Midstream

CE 0123

PZN: 18757399

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
1	180x60x20	23	400	54x40x54	10,4

newfoundland

Prostata-Gesundheit (in Kürze verfügbar)

Ein schneller Selbsttest zum Nachweis von prostataspezifischen Antigenen (PSA) durch kapillare Blutentnahme

Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein von der Prostata produziertes Protein, das für die Verflüssigung des Ejakulats und die Erhöhung der Spermienbeweglichkeit verantwortlich ist. Ein erhöhter PSA-Wert kann auf bösartige Erkrankungen wie Prostatakrebs, aber auch auf gutartige Erkrankungen hinweisen.

Bei etwa einem von acht Männern wird im Laufe ihres Lebens Prostatakrebs diagnostiziert. Prostatakrebs tritt mit größerer Wahrscheinlichkeit bei älteren Männern auf. Etwa sechs von zehn Fällen werden bei Männern diagnostiziert, die 65 Jahre oder älter sind.

Der Newfoundland Prostata-Test ist ein qualitativer Schnelltest zur Bestimmung der Gesamt-PSA-Konzentration im Vollblut. Der Test verwendet eine spezifische Kombination von Antikörpern, die speziell PSA erkennen können.

Leistung

- Nachweisgrenze für PSA im Blut – 4 ng/mL
- Genauigkeit 92 %
- Ergebnis in nur 5 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Blut

Format
Kassette

CE 0483

PZN: 18757465

Verpackungs-Optionen

Kit

Tests	Größe, mm	Gewicht, g
1	180x75x26	44

newfoundland

Schilddrüsenfunktion

Selbsttest für TSH im Vollblut zur Unterstützung der Schilddrüsenunterfunktions-Diagnose

Das humane Thyroid-Stimulating-Hormon (TSH) regt die Schilddrüse an, andere Hormone zu produzieren, die den Stoffwechsel von fast allen Geweben im Körper beeinflussen. Ein Zustand, in dem die Schilddrüse nicht genügend Hormone produziert, wird als Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) bezeichnet.

Sowohl Männer als auch Frauen können eine Schilddrüsenunterfunktion haben, obwohl sie bei Frauen häufiger vorkommt. In Großbritannien sind 15 von 1000 Frauen und 1 von 1000 Männern davon betroffen. Auch Kinder können eine Schilddrüsenunterfunktion entwickeln.

Der Newfoundland Schilddrüsentest ist ein Schnelltest, der TSH im Vollblutproben mit einer Sensitivität von 5 µLU/mL nachweist, wobei eine Kombination monoklonaler Antikörper zum selektiven Nachweis erhöhter TSH-Werte im Vollblut verwendet wird.

Leistung

- Nachweisgrenze für TSH – 5 µLU/mL
- Genauigkeit 98 %, Sensitivität 98 %, Spezifität 98 %
- Ergebnis in nur 10 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Blut

Format
Kassette

CE 0123

PZN: 18757488

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
1	130x70x20	39	360	50,5x38x41,5	15,6

newfoundland

Schwangerschaft

Selbsttest zum Nachweis des Hormons humanes Choriongonadotropin (hCG) im Urin als Indikator für den Beginn einer Schwangerschaft



Der Newfoundland Schwangerschaftstest ist ein schneller Lateral-Flow-Test zum qualifizierten Nachweis von humanem Choriongonadotropin (hCG) im Urin, der bei der Früherkennung einer Schwangerschaft hilft.

Der Test verwendet eine Kombination von Antikörpern, einschließlich monoklonaler hCG-Antikörper, um selektiv erhöhte hCG-Spiegel nachzuweisen. Der Test wird durchgeführt, indem Urin auf das Teststäbchen gegeben und das Ergebnis anhand der farbigen Linien ermittelt wird.

Der Newfoundland Schwangerschaftstest wurde für die Früherkennung entwickelt und wodurch ein hoher Fokus auf die extreme Empfindlichkeit des Tests gelegt wurde, der bis zu 6 Tage vor dem Ausbleiben der Periode Ergebnisse liefert.

Leistung

- Nachweisgrenze für hCG im Urin – 10 mIU/mL
- Genauigkeit 99 %
- Ergebnis in nur 3 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Urin

Format
Midstream

CE 0123

PZN: 18757459

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
1	190x60x22	35	336	55x46x39,5	13,1

newfoundland

Vitamin D

Selbsttest zum Nachweis von Vitamin D im Vollblut, um die Diagnose eines Vitamin-D-Mangels zu unterstützen



Niedrige Vitamin-D-Spiegel sind weltweit ein weit verbreitetes Problem, und zahlreiche Studien – aus der Grundlagenforschung bis hin zu klinischen Studien - haben einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel sowie chronischen und akuten Erkrankungen aufgezeigt. Jüngsten umfangreichen Beobachtungsstudien zufolge haben etwa 40 % der Europäer einen unzureichenden Vitamin-D-Spiegel, wobei 13 % einen schweren Mangel aufweisen.

Der Newfoundland Vitamin-D-Test ist ein Schnelltest, der auf dem Prinzip der konkurrierenden Bindung beruht. Je höher die Konzentration von 25 (OH) D in der Probe ist, desto heller ist die T-Linie. Das Ergebnis wird anhand der Vitamin-D-Farbkarte abgelesen, die dem Testkit beiliegt.

Leistung

- Drei Nachweisgrenzen für Vitamin D – mangelhaft (unter 10 ng/mL),
- unzureichend (10-30 ng/mL), ausreichend (30-100 ng/mL) und übermäßig (über 100 ng/mL)
- Genauigkeit 94 %
- Ergebnis in nur 10 Minuten

Verwendung
Selbsttest

Proben
Blut

Format
Kassette

CE 0123

PZN: 18757494

Verpackungs-Optionen

Kit			Karton		
Tests	Größe, mm	Gewicht, g	Tests	Größe, cm	Gewicht, kg
1	135x80x20	45	315	45x43x40,5	15,8

newfoundland